

DISSERTATIO MEDICA,  
INAUGURALIS,

DE

DIARRHOEA.

QUAM,  
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S. T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS  
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

CAMPBELL BETHAM,  
SCOTUS.

Soc. Reg. Med. Edin. Soc.

Ad diem 25. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,  
Academiae Typographos.

---

M, DCC, LXXXVII.

DIESE R. B. G. T. R. S. I. N. G.

ATQUE

ORNATISSIMO DOMINO

BASILIO GUILIEMO

DOMINO DARE

IN GUILIEMO R. B. G. T. R. S. I. N. G.

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

AGGREGATIONE

ILLUSTRISSIMO  
ATQUE  
ORNATISSIMO DOMINO  
BASILIO GULIELMO  
DOMINO DAER,  
QUI,

Animo vere generosissimo integerrimoque

Praeditus,

Philosophiam atque omnem doctrinam politioem,

Artemque ingenuam,

Miro amore et felici cultura,

Prosequitur ;

Hanc, qualemcunque dissertationem academicam,

Grati animi, summaeque observantiae,

Testimonium,

Dicatam voluit

CAMPBELL BETHAM.

ILLUSTRISSIMO

ATQUE

MISERATIONE MEDICAE

ORNATISSIMO DOMINO

BARNABE GUILLEMO

DOMINO DARE

QUI

Dr. Duncan

With most respectful comp

from the Author

CAMPBELL BETHAM

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

DIARRHOEA.

**Q**UAMVIS diarrhoea, sive alvi fluxus, inter morbos fit, qui saepissime occurrunt, curamque medicorum fere quotidianam sollicitant, facie tamen adeo diversa sese prodit, ut vix possibile sit aliquam proferre definitionem universalem, quae omnes ejus species rite complecti queat. Sequens autem, si quid ego judico, ad veram quam proxime accedere videtur.

*Diarrhoea dejectio est, frequens, copiosa, materiae liquidae, plerumque foeculentae.*

Ab auctoribus, antiquis omnibus, nuperis etiam quibusdam, hicce morbus ab aliis, qui ei

A

saepe

saepe fimillimi sunt, adeo imperite distinguitur, ut ex scriptis eorum vix ullam ejus certam diagnosis reperire possimus. Hoc autem non solum ad rei difficultatem, sed etiam ad observationem, saepe minus accuratam, referendum est. Nam etsi fateri cogimur, in quibusdam exemplis admodum esse difficile, medico etiam sagaci, *symptomata* hujus morbi *diagnostica* investigare, revera tamen ab omnibus aliis morbis differt, curationemque diversam postulat. Me igitur hanc qualemcunque dissertationem rite auspicatorum duxi, si primum omnium quae ad hunc morbum recte internoscendum videantur, adeoque ad meam definitionem suffulciendam conferant, ad examen breviter revocarem.

I. Ex morbis qui diarrhoeam maxime referre videntur praecipuus est *dysenteria*, quam non solum vulgus, sed medici etiam pertissimi, haud satis accurate a diarrhoea distinxerunt. Varia tamen sunt quae discrimen, idque maximi momenti, inter eas statuere videntur.

1. In fere omnibus enim dysenteriae exemplis, ineunte morbo, adest febris, quae, nisi auctores nos fallunt, in exemplis etiam plerisque mitioribus observanda est. Diarrhoeam vero febris

bris raro comitatur, quae, si unquam occurrit, non, nisi vigente morbo, sese prodit.

2. In dysenteria, quamvis ipsis morbi initiis, alvi dejectiones, primo et etiam secundo die, solita sua facilitate et specie interdum fiant; ulterius tamen progrediente morbo, stercus naturale raro dejicitur, et, si aliquando provenit, non nisi scybalorum vel faecum diu retentorum forma se ostendit. Parciores etiam sunt plerumque dejectiones, et fere solum ex mucositate intestinorum crassiorum constantes, haud raro sanguine commistae. Atque parcas has excretiones tormina violentissima, vehementisque semper desidendi cupiditas comitari inveniuntur. In diarrhoea, e contrario, alvi levationes, dum facile et sine dolore vehemente eveniunt, praeter solitum molles, liquidae, et copiosae sunt, atque vix unquam sanguine tinctae, nisi forsan quum morbus solito violentior evaserit.

3. In dysenteria, si auctoribus credendum est, qui hunc morbum diligentissime observarunt, faeces odorem putridum peculiarem emittunt. Cujus rei ratio forsan deduci potest ex eo quod febris in corpore vigeat, quaeque majorem putredinem in fluidis quae in canalem intestinorum infunduntur efficiat. Omnes autem me-  
dici,

dici, effluvia, quae ex hac faecum putredine oriuntur, appropinquantes eodem morbo afflicti vim possidere animadverterunt. Unde fit ut a medicinam facientibus dysenteria inter morbos contagiosos merito recenseatur. Atqui in diarrhoea nullus faecum foetidus odor singularis ejusmodi unquam sentitur, nec in ullo unquam exemplo hicce morbus contagiosus reperitur.

His igitur rebus, quibus diarrhoea et dysenteria inter se differre videntur, bene perpensis, quivis medicus peritus, sine ulla dubitatione, alteram ab altera, omnibus fere exemplis, primo intuitu, facile dignoscere poterit. Sin autem unquam fieret ut in errorem in hac re induceretur, id tantum evenire possit ipso dysenteriae initio, quando morbus hicce sub specie sua lenissima sese ostenderit. Error autem ejusmodi haud diuturnus esse potest. Progrediente enim morbo paulo ulterius, indicia haud dubia *diagnostica* brevi manifesta erunt.

II. Alter est morbus qui diarrhoeae in quibusdam admodum similis esse invenitur; is scilicet cui nomen *cholera*. Cuius autem observatori diligenti sequentia indicia ad hujus ab illo distinctionem, in plerisque haud obscuram, constituendam valebunt.



In hoc quidem, quamvis alvi dejectiones liquidae, copiosae, frequentesque adsint, eas tamen vomitus semper comitatur, bilisque copia magna non solum deorsum, sed et sursum ejicitur, cum torminibus ventris violentioribus, et musculorum abdominalium contractionibus spasmodicis, quibus brevi etiam membrorum, et praecipue surarum, spasmata succedunt. In illo vero, nausea quidem rarius, vomitus autem bilis nunquam, adesse observatur. Haud tamen diffimulandum, causas cholerae remotas, gradu minori occurrentes, non nisi diarrhoeae speciem efficere valere; quae res nonnihil haesitationis et ambiguitatis in talibus hujus morbi formis dignoscendis creare possit.

Quod quum ita sit, causae occasionales, aegri temperamentum, coelique natura in consilium adhibita, opem non contemnendam medico afferre inveniuntur. Cholera enim in regionibus meridiem versus frequentissime occurrit, iisque fere peculiaris est; septentrionales quidem, nisi anni tempestatibus calidissimis, raro invisens. Sin autem cholera, sub specie adeo miti ut eam a diarrhoea, cui nomen *biliosae* \*, medici dederunt,

\* Sauvag. Vol. 2. Spec. 8. p. 357.

runt, vix possibile sit distinguere, sese ostenderit, haud forsan operae pretium erit de diagnosi ejus nimis sollicitè disquirere, quippe in talibus exemplis idem sit cholerae ac diarrhoeae regimen atque curatio.

Prolatis igitur, quantum ad rem nostram facere videbatur, signis quae inter diarrhoeam morbosque ei similes discrimen constituunt, proximum esset ut varias species, quibus diarrhoea sese ostendit, exponere conaremur. Quod autem ut melius effectum demus, res necessario postulare videtur, ut quae sint symptomata in unaquaque morbi specie pro certo enumerare possemus. Hunc tamen finem quo minus rectè assequamur, impedit non solum propriae observationis defectus, sed etiam auxilii in his rebus a scriptoribus suppeditati inopia. Ad hunc defectum supplendum accuratam causarum diversarum remotarum, ex quibus hic morbis oriri videatur, investigationem quodammodo collaturam arbitratus sum.

In his igitur causis pro virili enumerandis, hoc in antecessum mihi concedendum spero, nullam existere posse excitantem diarrhoeae causam, quae motus intestinorum *peristaltici* impetum non augeat.

Haud

Haud equidem sum nescius, multos fuisse medicos qui ex intestinorum aucta laxitate et statu quodammodo paralytico, quae ibi continentur facilius et velocius ad intestinum rectum transire, indeque diarrhoeae speciem exhibere, putaverint. Sed quibus rationibus haec nitatur opinio, admodum foret dictu difficile. Nam liquido constat, ex flexu nunc sursum nunc deorsum intestinorum facto, faeces, quibus proprium pondus pro causa descensus praecipua habendum est, nunquam, identidem obstante vi gravitatis, sursum aequae ac deorsum meare posse; quod quidem necessario, idque velociter, in hoc morbo gignendo, faciendum est. Neque hoc facilius fieri potest recumbente corpore. Tali enim statu, faecum pondus, quod maxime descensum efficere putatur, omnino esset ad hanc rem inutile.

Praeterea, bene notum est, ubi octavum par nervorum in vivis animalibus perfectum vel compressum fuerit, ventriculum, simul ac ullo modo paralyticus evaserit, quae in se containerentur omnem expellendi vim perdidisse: Et occurrunt quotidiana exempla, alvo adstricta, ex ventriculi intestinorumque debilitate laborantium, qui alvum solutam ex stimulo adhibito, extemplo sentiant.

In *lienteria* quoque putarunt medici laevitatem intestinorum causam esse tam subito faecum excretionis. Nihil autem evidentius esse potest quam quod, in hoc morbo, ventriculus et intestina in statu sint admodum irritabili, quodque, adhibito cibi stimulo, motus peristalticus plane violenter sit excitatus. Haud ideo tamen negandum, copiosiore materiae mucosae secretionem in canalem intestinorum effusam, ita ut, aucto jam motu peristaltico, meatum magis lubricum efficiat, velociorem transitum faecum magnopere posse promovere.

Ipsam quoque faecum pondus atque pressuram, quae, praesertim ex statu corporis erecto oriuntur, ad motum peristalticum excitandum, adeoque ad ipsas faeces celerius excernendas nonnihil conferre posse concedendum est.

Quum igitur haud ambigi possit, motus peristaltici incrementum proximam esse causam diarrhoeae, omnes jam nobis enumerandae sunt causae, unde hujusmodi incrementum provenire possit. Hae autem in duas classes commode dispertiri posse mihi videntur.

Prima est earum quae vim suam primitus ostendunt in alias corporis partes, inter quas et intestinorum canalem consensus evidens existat.

Altera

Altera est earum quae canalem ipsum intestinorum immediate afficiunt, suaque vi stimulante motum peristalticum accelerant.

I. *Causae aucti motus intestinorum peristaltici quae alias corporis partes primitus afficiunt.*

Sub hoc capite complecti possunt varii affectus animi, quorum actio, sine dubio, primitus est in cerebrum.

1. Inter hos metus praecipue recensendus est, cujus non solum auctores, sed et quotidiana observatio innumera praebet exempla, ubi hic animi affectus, subito et violenter superveniens alvi fluxum extemplo ciet.

2. Sunt et alii affectus qui eandem rem edere observantur, qualis dolor animi vehemens; cujus exemplum insigne nobis protulit in praelectionibus suis celeberrimus noster praeceptor *Cullenus*, ubi mentionem fecit cujusdam foeminae, quam, quoties subito moerore gravi correpta esset, statim aggrediebatur diarrhoea.

3. Frigus etiam corporis extremitatibus admotum inter causas est diarrhoeae. Hoc egregie confirmat exemplum a *Rega* \*, Professore Lovaniensi, prolatum. ‘Duci enim (inquit ille)

B

‘Ferra-

\* Vide opus ejus de Sympathia, p. 346.

‘ Ferrariensi triduana alvi stypticitate laboranti,  
 ‘ suavit medicus ejus Michael Savanorola ut nu-  
 ‘ dis pedibus supra pavementum alabastrinum a-  
 ‘ qua frigida prius conspersum, incederet tanto  
 ‘ felice effectu, ut nondum quinquaginta passus  
 ‘ progressu, Principi alvus sit soluta.

Ex hoc fortassis exemplo similem medendi methodum didicerunt alii medici; et ad alvum adstrictam solvendam a se adhibitam ejusmodi sanationem in actis Edinburgenis narravit medicus quondam celebris, *Joannes Stevenson* \*.

4. Ejusmodi etiam consensum inter intestina aliasque corporis partes existere manifestum est, ex eo quod in dentitione accidit. Infantes enim gingivarum irritatione, dum dentes prorumpunt, a diarrhoea corripri solere notissimum est.

II. *Causae motus peristaltici aucti quae intestinis ipsis immediate applicantur.*

Variae quidem et multiplices sunt causae, quae, ipsis intestinis immediate applicatae, motum peristalticum augent; quae tamen omnia ad haec tria capita referri possint.

Primum complectitur irritamenta plurima quae per os ingeruntur.

Secun-

\* Vide Edin. Med. Essays, Vol. vi. P. II. p. 890.

Secundum comprehendit humores, ab excernentibus quae fluida sua in intestina fere perpetuo effundere solent, infusos, aliquando copia auctos vel indole mutatos.

Tertium denique illa, quae, extra tubum *intestinalem* genita, tunicas ejus erodendo in tubum ipsum se insinuant.

De his igitur jam figillatim agendum.

I. Ex irritamentis quae per os ingeruntur, praecipua sunt alimenta; haec enim, propter ventriculi debilitatem male concocta, atque hinc in intestina, statu praeter solitum acri, recepta, motum de quo agitur velociorem reddere possint. Eadem etiam nimis copiose in ventriculum, indeque in intestina admissa, ad istam diarrhoeae speciem (uti scriptores optimi observarunt) quae vulgo *crapulosa* nuncupatur, efficiendam valeant.

Sed alimentorum non solum nimiam copia, verum etiam qualitas hos effectus gignere notatur; si enim saccharo seu sale marino abundant, diarrhoeam inducere inveniuntur. Itaque pueri qui bellariis, caeterisque cupediis saccharo repletis, nimis sibi indulgent, hoc morbo affici saepe observantur. Idem usu venire advenis plerisque, loca invisentibus ubi aqua est quodammodo *muriatica*, notissimum est.

Verum

Verum nulla alimenta, alvi fluxum cientia, notiora sunt fructibus *acido-dulcibus*, non solum saccharo conditis, sed etiam recentibus; unde fit ut, tempore autumnali, diarrhoea imprimis grassari observatur. Quum autem quidam sint homines qui hos fructus magni quidem copia assument, nec tamen diarrhoeam patiuntur, dubitarunt nonnulli an fructus isti propria qualitate alvum solvant, an tantum nimia copia bile commisti purgantes fiunt. Non quidem inficias eundem est ejusmodi fructus, magna quantitate sumptos, propria sua qualitate vim intestina stimulandi possidere; multo tamen probabilius videtur, eos plerumque motum peristalticum augere, bilis effusionem auctam sollicitando, cum quae ea, certis proportionibus commistos, intestina stimulandi vim suam acquirere. Hanc quidem hypothesein prae caeteris scriptores adoptasse videntur; remque ita se habere indicia non desunt. Faecum enim color his exemplis semper plus minusve viridis est, quod ex acidis cum bile commistis solum evenire observatur.

Res etiam putridae, in tubum intestinorum admittae, inter causas hujus morbi remotas censendae sunt: Neque desunt exempla numerosa ubi ii qui res putrescentes etiam parva quantitate  
sump-



sumpserint, cito diarrhoea correpti fuerunt. Multi auctores eo usque progressi sunt, ut odores ex rebus putrescentibus provenientes per halitum inhaustos, causas dysenteriae fuisse crediderunt; quum vero nulla sunt indicia morbi ejusmodi contagiosi hoc modo geniti, verisimile est ejusmodi morbum non nisi diarrhoeam fuisse.

Praeter id quod proprie dicitur alimentum, multae quidem res in ventriculum sub nomine medicamentorum seu venenorum receptae, et in intestina delatae, eorum motum peristalticum accelerare inveniuntur. In plerisque tamen exemplis, ubi hoc fieri observatur, dejectio parum diuturna est, et saepe pro morbo vix proprie habenda. Sin autem eveniret, ut hae res majore quantitate acrioreque qualitate adhibiti fuerint, tum quidem fieri potest, ut morbus periculosus inde sequeretur; morbumque hujusmodi, Nosologi, inter quos celeberrimus *Sauvagesius*, species diarrhoeae recensentes, nomine *Diarrhoeae ex hypercatharsi* designarunt.

Canalis alimentarius vero, praeter ea quae per os ingeruntur, fluida quoque recipit diversarum specierum et qualitatum, quae non solum ad promovendas mutationes necessarias quas alimenta in meatu ad inferiorem partem sunt subitura,

tura, sed etiam ad actionem ipsorum intestinorum sustentandam, sunt necessaria. Haec fluida, quantumvis quaedam eorum in statu suo naturali motum peristalticum augere valeant, omnia, quando acrimonia praedita fuerint, causae diarrhoeae potentissimae evadunt.

In his enumerandis imprimis notare licet, succum *pancreaticum*, qui, quamvis in statu suo naturali, fluidis quae a glandulis salivariis feceruntur, sit simillimus, et natura miti ac blanda praeditus videatur, eundem tamen non solum morbis, qui ejus organum fecernens afficiunt, sed etiam medicamentis in massam communem fluidorum receptis, quae per hunc egressum exeundi proclivitate ostendunt, saepe vitari acremque reddi verisimile est. Medicamentum quod hic praesertim intelligimus hydrargyrus est, qui in corpus copiosius ingestus, propensionem insignem ad augendum acrioremque salivam oris reddendam ostendit. Quoniam, cum is adhibitus est, diarrhoea tam saepe supervenit, non sine magna probabilitate suspicari licet, analogiam quae inter *pancreas* et salivales glandulas existit, illud simili cum his affectioni obnoxium reddere. Ita saltem opinantur scriptores celeberrimi, cujus etiam mentionem facit in praelectionibus

lectionibus suis expertissimus noster praeceptor *Monro*. Verisimillimum etiam est, immo pene certum, quando pancreas inflammatione, schirro, vel suppuratione affectum sit, ipsius succum, tum quantitate, tum qualitate mutari, et inde, in statu acri effusum causam diarrhoeae fieri posse.

Inter humores, de quibus modo loquimur, *bilis* praecipuum locum tenet, quae etiam in statu suo naturali pro stimulo motui intestinorum a medicis habita fuit. Nec quidem dubium est, quin ea, aucta quantitate, saepe effundatur; et verisimile est diarrhoeas, quae in regionibus calidis tam saepe occurrunt, ex hoc fonte praecipue derivari. Quamvis autem ejus quantitas non aucta fuerit, tamen nulla est causa quae nobis non credere persuadeat, eam, quemadmodum alia fluida ex organi eam fecerentis, vel fluidorum massae unde provenit vitiis, statu praeter naturam acri effundi, diarrhoeamque efficere posse. Quin et ipsum jecur, ex propriis sibi morbis, materiam saepe effundit purulentam vel saniosam per ductus biliares in tubum alimentarium, quae motum peristalticum certissime accelerat. Huic diarrhoeae speciei ita genitae quidam scriptores nomen *hepatirrhoeae* imposuere.

Humores

Humores autem qui ex istis fontibus fluunt non nisi humorum parvam partem constituunt, qui in tubum alimentarium infunduntur. Bene enim notum est, ex tunicarum intestinorum sectione, eas folliculis numerosis instructas esse, qui intra se mucii quantitatem continent, indeque in hunc tubum infundunt, unde nomen hi *folliculorum mucosorum* sibi sortiti sint. Hos folliculos esse adaptatos ad fluida tenuia et acria quae in illos ab arteriis infunduntur retinenda, donec stagnando evadant spissiora, fiantque blandiora ad tunicas intestinorum illinendas, atque adeo easdem adversus res acres tuendas, communis fuit inter physiologos opinio. Non minus tamen est verisimile saepe fieri, ut fluida, quae in his folliculis stagnare debent, in canalem intestinorum simulac a sanguine fecernuntur infundi possent, atque in hoc tenui acrique statu motui peristaltico stimulo sint.

Sed praeter humores qui ex his folliculis mucosis proveniunt, magna copia fluidi tenuioris in tubum alimentarium per exhalantia, quae in eundem magno numero aperiuntur, perpetuo depluit. Quae vasa satis manifesta reddiderunt celeberrimi *Kaaw* \* *Boerhavaii* injectiones; et  
haec

\* Vide opuscul. ejus, perspiratio dicta Hippocrat.

haec nempe exhalantia liquorem fecernunt, qui *strictè intestinalis* nuncupatur.

Ex his vasis fluidi effusio saepe excitari potest solito copiosior, non solum a majore fluidi quantitate in ea impulsa, quae auctam illorum actionem necessario reddat, sed etiam a motus peristaltici incremento, quod haec vasa tunicas intestinorum transeuntia comprimit, majoremque copiam fluidi effundere cogit. Haud quidem probabile est, hoc fluidum in statu suo naturali motum peristalticum incitare; sed verum videtur, cum totum systema, vel etiam quaedam ejus partes, morbo afficiantur, fluida, quae per vasa intestinalia fecernuntur, non solum acriora reddi, sed derivata esse ex iis quae per alia organa fecernentia abire solebant. Inter haec praecipuus est qui per cutem exhalatur, et nunc, ob impeditum per superficiem corporis egressum, huc affluit. Urina quoque, quum in *ischuria renali* quo minus in vesicam transeat impediatur, per intestina saepe abire observata fuit. Unde hanc diarrhoeae speciem a clarissimo *Sauvagesio* sub nomine *diarrhoeae urinosae* notatam invenimus\*.

Sunt et alii liquores a vasis absorbentibus in

C

ducti,

\* Sauvage, vol. 2. spec. 9. pag. 357.

ducti, qui per vasa intestinorum abire, adeoque diarrhoeam gignere, videntur. Hujusmodi est materia purulenta ab ulceribus absorpta, quae, ut scripta medicorum referunt, per hanc viam saepe abiisse reperta fuit \*. Quamplurima etiam exempla proferri possent, ubi sanguinis pars serosa in variis corporis cavitatibus, ut in hydropticis, collecta, subito absorpta, et per hunc exitum emissa, diarrhoeam genuit.

Quin et ipsum lac, uti crediderunt et narra-  
runt Gallorum medici atque chirurgi, ex mam-  
mis mulierum lactantium absorptum, per tubum  
intestinorum abire observatum fuit, et inde orta  
est diarrhoeae species quae a viro clarissimo *Sau-  
vagesio* sub titulo *coeliacae lacteae* recensetur.

Optimo quoque jure credimus, in communi  
fluidorum massa ex mutationibus quas in mor-  
bis saepe subeunt, talem materiam acrem gign-  
ni, quae abire possit per vasa intestinorum excer-  
nentia, morbumque de quo agimus saepe exci-  
tare. Sic in omni febre, ubi nonnihil fluidorum  
putredinis locum habere videtur, diarrhoea saepe  
supervenit, quod ita fieri credere fas sit ex  
mutata secretionum intestinalium natura. At-  
que

\* Sauvage, spec. 11. pag. 358.

que hoc verifimilius videtur, quando animum ad diarrhoeae frequentiam sub finem \* *exanthematum*, quales sunt *variolae*, *rubeola*, et *scarlatina*, quae, uti merito crediderunt medici, ex morbida in communi massa acrimonia, ad abeundum per hanc excretionem parata, provenit. In nonnullis etiam morbis † febrilibus idem usu venire verifimile est, ubi observarunt medici morbi *crisin* a diarrhoea superveniente pendere, nullamque in iis *crisin*, nisi comitante diarrhoea, se ostendere.

3. Multi praeterea abscessus in vicinia intestinorum, scilicet, in visceribus vicinis quae intestinis agglutinari possint, oriuntur, quae acrem suam materiam per erosas intestinorum tunicas in tubum alimentarium infundunt, atque causae diarrhoeae evadunt. Sic etiam abscessus quae in tunicis intestinorum ipsorum formantur, humores suos in tubum ipsum per tunicas interiores ejus erosas immittunt. Hi morbi cl. Sauvagesio sub titulo ‡ *diarrhoeae purulentae* enumerantur, atque illa diarrhoea quam tanquam e mesenterii vomica proveniente idem recenset, hujus

\* Sauvag. vol. 2. spec. 6. p. 356.

† Sauvage, spec. 20. pag. 360.

‡ Vol. 2. spec. 2. pag. 358.

hujus forsitan generis habenda est. In quibusdam etiam exemplis, ex ruptis in superficie interna intestinorum ipsis vasis sanguiferis, fluida effundantur, quae vel ipsa motus peristaltici stimulantia fieri, vel maximam partem materiae excretæ præbere possint. Hujusmodi exemplum insigne nobis præbet morbus, cui nomen *melaena*.

Porro, sunt etiam res quae intra tubum alimentarium genitæ, ibique hospitantes, illum irritant, diarrhoeamque sæpe gignunt. Ex his præcipue \* vermes indicare licet, quae vario motu et irritatione diarrhoeam frequenter excitant.

Chylus etiam, caeteraque fluida in hujus tubi cavo existentia, et a quibus absorptis corporis nutrimentum pendeat, cum a morbis lacteorum quo minus absorptæ vel in vasa sanguifera provectæ sint impediuntur, in cavitatem intestinorum aliquandiu immorantia, vel pro stimulo motui peristaltico, vel per intestina descendencia, causæ isti diarrhoeæ speciei sint, quam auctores *coeliacam* appellarunt.

Denique,

\* Sauvage, II. spec. 14. p. 358.



Denique, inter causas diarrhoeae non praetermittenda est una quaedam, quae quamvis non adeo frequens sit, interdum tamen diarrhoeam sine dubio efficit. Erythema scilicet, quod totum tractum tubi intestinorum aliquando afficit, quodque, cum sedem suam ibi posuerit, nunquam non diarrhoeam efficere invenitur.

Ex iis omnibus igitur quae jam dicta sunt de diarrhoeae formis diversis (quatenus saltem quod ad morbi causas attinet diversae appellari possint) facile constabit, diarrhoeam frequentissime aliorum morborum affectionem *symptomaticam* esse, atque pro morbo *idiopathico* raro haberi posse.

Perpendentibus autem quale remedium diarrhoeae adhibendum sit, constabit sanationem ejus, utpote morbi *symptomatici* sanatione morbi *primarii* niti oportere, et ejus investigationem non esse hujus loci.

Quaenam vero sint diarrhoeae exempla, quae pro *idiopathica* haberi possint, difficile dictu invenio. Vellem tamen affirmare, motum peristalticum auctum, qui neque a morbo in ullo alia corporis parte, sed a causis in intestinis solummodo, atque cum aliqua diuturnitate agentibus oritur, illum solum diarrhoeam gignere quae *idiopathica* proprie vocari debet.

Itaque

Itaque alvi dejectiones solito copiosiores animi affectione subita quadam ac fugaci ortae, pro morbo vix haberi possunt. Si vero hae valde immodicae evaserint, eorum tradetur fanatio cum de diarrhoea idiopathica posthac agendum sit.

Simili ratione diarrhoea ex *hypercatharsi*, quae five ex medicamento seu ex veneno in intestina, casu aliquo, ingesto oriatur, pro morbo vix habenda est. Attamen, si quando haec modum adeo superare, ut ei remedio opus sit inveniatur, id quoque tradetur postea quum ad curationem diarrhoeae idiopathicae ventum fuerit.

Idem fere dicendum de diarrhoea quodammodo superveniente ex alimentis laxandi qualitatem habentibus copiosius ingestis, quippe quod plerumque fit malum tantum transiens, vel eodem modo quo alia hypercatharsee exempla fanandum. Verum enim vero aliud est diarrhoeae exemplum in tubo alimentario genitae, atque saepe ex causa aliquid diurnitatis habente provenientis; ex quibus putaret quis hoc verum exemplum esse diarrhoeae idiopathicae, ejus scilicet quae, uti supra diximus, diarrhoea crapulosa nonnunquam nuncupatur. De ea quidem hic loci lubentes ageremus, nisi plane esset ventriculi

tricoli et non intestinorum morbus, nec remediis sanandus intestinis admotis, inque motum peristalticum directo agentibus, sed ab iis quae in ventriculum agunt, quaeque ejusdem vitia corrigendo apta sunt. Ejusmodi autem morbi tractatio non hujus dissertationis est.

Sunt et quaedam alia diarrhoeae exempla ubi canalis intestinorum afficitur, et quae in eo ipso canali exorta ibi, modo constante, agunt, quae tamen an sub titulo diarrhoeae idiopathicae comprehendendi sint, dictu foret difficile. Exempli gratia, succus *pancreaticus*, ut supra memoravimus, insolita quantitate, vel statu acriore effusus, diarrhoeam forsan efficere possit.

Quum autem de remedio diarrhoeae agendum erit, liquebit exempla illa ab affectionibus pancreaticis provenientia, non argumenta esse hic loci tractanda, tum quod difficile sit eorum existentiam liquido determinare, tum etiam quod ex iis nonnulla, etsi pro certis comperta fuerint, tamen ex natura sua immedicabilia sunt, vel saltem medicamentis quae in tubum intestinale, vel in propriam causam proximam diarrhoeae agant, non sunt sananda. In remedio igitur diarrhoeae idiopathicae investigando, nobis praetermittere

mittere licet species illas omnes quae a statu pancreatici pendeant.

Veruntamen alter est quem jam diximus fons humoris, in tubum intestinale perpetuo depluentis, ex quo diarrhoea provenire potest, ductus nimirum biliales, qui liquores varios effundunt, et quarum effusionum existentiam saepenumero percipere, actionesque melius intelligere, possumus.

Ex his fluidis non dubium est quin unum, ipsa scilicet bilis, ut antea diximus, in intestina infusa, quod ad quantitatem et acrimoniam, varia esse possit; et quamvis non eo quantitatis et acrimoniae progressa fuerit, ut cholera effecere valeat, tamen satis copiosa et acris esse potest, ut causa existat diarrhoeae quae *biliosae* nomine rite designata fuit.

Est igitur ut eruditi forsan arbitrentur ejusmodi malum, si diuturnam est, diarrhoeam idiopathicam censendum esse. Non autem, me iudice, de ea, ac si talis esset, hic agere necesse est, quippe cujus remedium, quatenus ad cholerae naturam accedat, bene intellectum sit; et quae ulterius necessaria forent, ad istam bilis redundantiam corrigendam, quae tempestatum calidiorum *cholera* vel coelorum calidiorum *diarrhoeam*

*rhœam biliosam* efficit, nondum in medicorum scriptis explicata invenio, neque egomet explicare audebo. Hic igitur diarrhœam biliosam, utpote non idiopathicam, missam facio.

Non hic tamen omittendum, quod et supra notavimus, praeter bilem statu quem diximus vitioso e ductibus biliariis effusam, alios diversi generis humores acres ex jecinoris affectionibus organicis provenientes, ab iisdem ductibus profundi, atque ad diarrhœam efficiendam valere posse. Sed constabit tales diarrhœas generis esse symptomatici; ideoque, vel quomodo earum existentia pro certa statuenda, vel medendi methodus exponenda sit dicere, ab instituto meo plane alienum esse.

Observandum etiam, dum mentionem facimus diarrhœae e bile provenientis, quamquam bilis nec satis quantitatis, vel acrimoniae habeat, ad diarrhœam excitandam, exemplum tamen est, ubi hicce humor ad hanc rem magnopere conferat. Istud nempe in quo, cum acidum quid vel ex alimenti ingesti natura, vel ex cibo minus recte concocto, in ventriculo abundans, in duodenum copiosius, quam quod bilis quae ibi est recte corrigere possit, infundatur, verisimile est, hancce acidi nimietatem, intestinis sti-

mulo fore potenti, atque diarrhoeam excitatutam, hoc *phaenomeno* praecipue insignitam quod in ea faeces excretae subvirides sint.

Hoc imprimis illustratur a diarrhoea quae \* infantibus lactentibus tam saepe evenire solet, quaeque ex nimia lactis, quo se ingurgitant, qualitate acescente oriri videtur. Notum enim est, ut jam supra diximus, ipsum lac sine bilis mixtura ad ejusmodi colorem efficiendum nequaquam sufficere.

Possset igitur hic morbus tanquam diarrhoeae idiopathicae speciem considerari, ideoque expectandum esset mihi hic tractari debere. Sed opinor hoc non recte fieri posse, propterea quod morbus a causa quae originem sumit in ventriculo, vel ex natura alimenti ingesti, vel ex ipso alimento male concocto, oriatur, quique non remediis in statum motus peristaltici in intestinis agentibus, sed eodem curationis genere quo morbus ventriculi tractari solet, sit sanandus. Quod quidem vel a rebus quae minus facile concoqui possent cavendo, vel ventriculi tonum redintegrandi, faciendum est. Est quidem diarrhoeae species quam, ut jam observavimus, diarrhoeam

\* Sauvages vol. 2. spec. 19. pag. 359.

arrhoeam *crapulosam* nuncupare fas esset, quae cum diarrhoea idiopathica saepe quidem conjuncta invenitur; sed, quia ipsa non revera idiopathica, sed symptomata est, ut eam tanquam morbum primarium ad examen hic revocem minime necesse est.

His igitur, aliisque id genus, expeditis, in hoc tentamine contendere volo diarrhoeam proprie idiopathicam dicendam, eam esse quae ex aucta excretionem exhalationis et mucosae intestinorum vel alterutrius in statu ad stimulandum motum peristalticum idoneo oritur; et ex conditionibus in ipsis intestinis vel in aliis corporis partibus quae constantia quadam ejusmodi excretionem efficere possint. Talis diarrhoea dicta fuit, atque etiamnum dici potest, *mucosa*; etenim opinor fluidi mucosi excretionem semper adesse; et, quoniam dictu sit impossibile, quantae sint partes in hac re quas sustineat altera excretio, conjicique possent causas allegandas binas has semper excretionem simul comprehensas, idcirco pro toto morbo nomen *diarrhoeae mucosae* usurpo.

## DIARRHŒA MUCOSA.

Hujus symptomata sunt dejectiones frequentes, liquidae, aliquanto faeculentae, interdum ex materia plane mucosa, sed nullo sanguine, neque fluido praeter naturam ullo, constantes. Has dejectiones praecedunt tormina plus minus violenta; raro autem sequitur tenesmus, gradu etiam minuto, nec is quidem nisi qui ab humore acri, anum irritante, proveniat. Morbus interdum, sed raro, cum febre conjunctum se ostendit, vel cum symptomatis paroxyfimi febrilis incipit. Quamvis autem sit sine febre, tamen sitis fere semper adest. Multum plerumque *flatulentiae* praesto est, tum intestinis, tum ventriculo inclusae, et dejectiones saepe praecedunt, ac comitantur borborygmi, ventriculus saepe anorexia afficitur, et saepe quidem cibi non concocti signa ostendit. Quae vero hunc morbum in omnibus fere suis symptomatis a dysenteria et cholera distinguunt, supra jam satis ample tradita fuerunt.

Hunc



Hunc morbum ullius aetatis aut temperamenti esse percipere nequeo, quippe qui mortales omnium aetatum et constitutionum aliquando aggrediatur. Facilius tamen eas afficit qui in statu suo consueto alvo solutae sunt obnoxii, quae res forsan fere semper motum peristalticum celeriore aut irritabiliorem, vel simul forsan affluxum copiosiore fluidorum in tubum intestinale ostendit.

Cum de variis aucti motus peristaltici causis jam diximus, et de iis quae vel symptomatice vel idiopathicam diarrhoeam dare possint statuimus, ut de diarrhoeae mucofae causis quae a statu fluidi *intestinalis* solo pendent nunc agamus.

In his fluidis acrimonia ex causis quae nos latent oriri possit, eamque tantum supponere licet, quum simul in systemate sit generalis, uti in *scorbuto*, *hectica*, *cancro*, aliisque morbis in quibus acrimoniae aliquid, una cum liquore *intestinali*, in intestina immitti possit, atque diarrhoeam efficere. Ibi autem morbus affectio plane symptomatice est, ideoque hic non considerandus. Existimandum est igitur, acrimoniam fluidorum intestinalium, quae pro causa diarrhoeae idiopathicae a nobis habenda sit, ex iis quae eorum

rum

rum affluxum auctum comitantur praecipue ac tantum oriri, locumque igitur in eorum secretionem solummodo habere.

Verisimile est liquorem *intestinalem* aucta quantitate, etiam quod ad qualitatem suam mutari, extremitatesque arteriarum exhalantium, pro puro fluido aquoso effuso, summopere saltem miti, portionem acris serositatis effundere posse. Sed, quanquam hoc verisimile videtur, conjectura est adhuc, ex eo quod evenit, non bene confirmata. Hoc autem certius est, mucum vix unquam solito copiosorem, nisi simul acriorem effundi. Ex omnibus quae de muco in variis corporis partibus novimus verisimillimum videtur eum, uti ab arteriarum extremitatibus seceratur, in statu tenui atque acri esse, eumque tantum in folliculis ad illum recipiendum et retinendum paratis stagnantem, inde acquirere lenitatem, spissitatemque, quas in illo observamus, dum ex folliculis in superficiem et membranas quas illinere destinetur exudat. Ex hoc autem intelligitur, quod quum secretio ab arteriarum extremitatibus solito copiosior sit, ea quidem impedit quō minus in folliculis stagnet, atque adeo in acri suo statu in membranarum superficiem effundatur. Si hoc ullibi eveniat, fieri certe

certe potest in tubo *intestinali* per totam longitudinem suam magno folliculorum numero instructo, qui igitur ingentem aliquando acris fluidi copiam effundere potest. Intestinalium fluidorum quantitas et simul acrimonia pro causa quidem praecipua diarrhoeae idiopathicae haberi potest, quamque titulo *diarrhoeae mucosae* insignivimus; sed porro necessarium est, ut causas etiam quae augmentum excretionum intestinalium efficiant investigare conarer.

Earum maximi esse momenti, et propterea imprimis notanda mihi videtur, exhalationis per cutem obstructio. Bene notum est, quotidianam excretionem cujusdam materiae ad certam quantitatem ab animali oeconomia necessario requiri; hanc etiam, magna ex parte, per cutaneam exhalationem fieri, et quando haec impeditur, naturam sive oeconomiae leges, istam materiam alio avertere, ut hoc modo quantitas necessaria e corpore ejiciatur. Verisimile est hoc saepe fieri aucta a pulmonibus exhalatione; et manifesto saepe fit aucta per meatus urinarios excretionem. Hae forsan naturae methodi maxime consuetae sunt; evidens tamen est, exhalationem per cutem impeditam aliorum saepe dirigi, et speciatim saepe in glandulas mucosas in-

qua-

quarundam membranarum superficie interna positas, uti in *coryza*, *cynanche tonsillari*, et *catarrho* videre est. Quoniam vero, quum sanguinis ad corporis superficiem fluxui resistitur, inde necessario oriatur auctus ad partes interiores affluxus, satis probabile est, hunc ad intestina saepe directum fore. Hinc vero fieri potest, ut exhalatio per cutem impedita ad numerosissimas glandulas mucosas in intestinorum superficie interna dirigatur, adeoque ad diarrhoeam mucosam efficiendam valeat. Patebit igitur, causam hujus diarrhoeae remotam, exhalationem per cutem obstructam frequenter esse posse, eamque porro a solita hujus obstructionis causa, frigore scilicet superficie corporis admoto, saepe provenire.

Frigus exhalationem per cutem impedit, praesertim toti corporis superficie admotum. Sed cum cujuscunque cutis partis cum omnibus aliis ejusdem partibus consensus est, et communicatio facilis, ita frigoris alicujus momenti gradus, uni alicui parti admotum, totius constrictionem, et inde obstructam exhalationem impedire, adeoque diarrhoeam etiam efficere possit. Est tamen una corporis pars, pedes scilicet, in quibus frigoris admoti actio imprimis est notabilis. Nam non  
solum

solum hic, uti in aliis partibus, frigus exhalationem per cutem impediendo, sed etiam ex speciali consensu qui inter pedes et canalem alimentarium intercedit, operatur. E. g. frigoris pedibus admoti effectus in colica inducenda bene noti sunt, et ejusdem in vires quae motum peristalticum sustentant magnos esse demonstrant. Minime tamen putare necesse est effectum hunc in affectionibus tantum spasmodicis subsistere; nam possit etiam totum peristalticum motum efficere, adeo ut omnes excretiones intestinales augeat, et hoc modo diarrhoeam certius gignat, uti quidem saepissime facere compertum est.

Praeter frigus admotum, quaenam aliae obstructae per cutem exhalationis causae existere possint parum constat. Multas autem alias esse conjicere licet, et imprimis quaecunque seu in corpore, sive in animo agant, quae sanguinis circuitum, atque adeo fluxum ejus versus corporis superficiem minuunt.

In his enim omnibus languidae et parcioris per cutem exhalationis, atque exinde copiosioris ad partes internas affluxus exemplis, plura simul contingere possint, quae cursum fluidorum ad intestina promoveant, atque ita diarrhoeam eodem

modo quo per cutem exhalationem directe impeditam efficiant.

Haec sunt diarrhoeae mucosae causae diversae, quatenus eos indagare possumus. Proximum igitur erit diarrhoeae sic constitutae effectus singulatim examinare, quo facilius quisnam sit morbi eventus determinare valeamus.

Imprimis igitur, hujus morbi effectus erit, ut seipsum continuet, atque excretionem morbidam augeat. Ex quibus necesse est, ut totum corpus sit exhaustum et debilitatum, atque sanguinis porro circuitus ad corporis superficiem vis, multo debilior fiat; ideoque, tum propter hanc debilitatem, tum propter influxum in intestina factum, necesse etiam est, ut per cutem exhalatio magnopere diminuatur, atque ut diarrhoea, magis magisque aucta, perpetuo progrediatur. Verisimile simul est, dum motus intestinorum peristalticus acceleratur, itidem acceleratum fore motum ventriculi, et tum ex debilitate, tum ex evacuatione accelerata impediante quo minus concoctio sit absoluta, necesse est ut ventriculus quantitatem crudae materiae in intestina perpetuo immittat, unde diarrhoea augebitur, corpusque parte alimenti sui privabitur. Ex omnibus his causis effectus diarrhoeae in tono totius systematis, et praesertim

praesertim tubi alimentarii debilitando, facile apparebit. Hi effectus, quod ad motum, diversi esse possunt, et in variis hominibus varii, in multis autem exemplis periculosi, et ad quendam gradum provecti lethales evincant.

His perpensis, proximum esset, ut morbi remedium indicare aggredieremur. Errores vero eos in quos medici, in hujusce morbi curatione quotidiana versati, incidisse videntur, prius examinare forsan operae pretium foret. Inter hos enim in usu fuit, imprimis catharticum, praesertim rhabarbarum, praescribere; nullum autem fundamen, in quo mos ejusmodi generalis nitatur, reperire possum. Nulla enim est hic acrimonia evacuanda, vel si revera adsit, ipsa sui evacuationem, quatenus hoc ulli bono infervire possit, efficiet. Acrimonia quae hic adest in diarrhoea de qua agimus, nec in cavo intestinorum genita est, nec ei ullo modo inhaeret, sed in eam ex mucosis excernentibus, vel intestinorum exhalantibus infunditur, et quatenus motum peristalticum excitet, sibi curae est sui ipsius evacuatio, quae adeo parum ad morbi sanationem confert, ut potius affluxum ulteriorem similis materiae ad continuandum et promovendum morbum augeat.

Ex iis quae protulimus de acrimonia quae in hoc morbo adesse possit, manifestum erit, additamentum ullius stimuli peristalticum motum amplius excitantis, plus adhuc aucturum acrioris materiae affluxum; et quamvis ad celeriores ejus excretionem etiam conferre possit, fontem ejus penitus exhaurire nequibit, et potius ut copiosior sit efficiet, atque hoc modo morbum continuabit malignioremque reddet. Quantum hoc omne ad usum cathartorum in diarrhoea spectant satis erit manifestum, et inde constabit praxin vulgarem in hac re admodum esse ineptam. Falsis enim notionibus de eo quod ad morbi naturam attinet plane nititur.

Hoc autem posthabito, proxime nobis inquirendum est, qualis sit morbo huic medendi methodus convenientissima. Quum, in omnibus aliis morbis medendis, prima indicatio est, ut causas remotas auferamus; in hoc igitur indicatio erit obstructae exhalationis per cutem instauratio, atque exinde frigoris admoti obstructionem efficientis devitatio.

In hunc finem corpus calidum praestandum est, quod forsan optime faciendum est, aegrum in lectum reponendo et bene tegendo; vel, si hoc difficile reddat, dejectionum

fre-



frequens recursus, aegrum e lecto sublatum bene vestitum oportet, et praesertim panno laneo ubique cuti admoto. Alii praeterea modi ad exhalationem per cutem renovandam inveniendi sunt, idque cursum copiosiore sanguinis ad corporis superficiem dirigendo. Una, eaque potentissima, hoc faciendi methodus est, qua nauseam et vomitum, ipecacuanha vel tartaro emetico ciemus. Quam autem efficacia haec medicamenta sint in sanguinis fluxum ad corporis superficiem dirigendo, jam bene intellectum est, eorumque effectus in catarrho ac diarrhoea saepe experiendo compertum fuit. Emeticum quidem *antimoniale* sine dubio remedium potentissimum est. Quoniam vero ad purgandum in diarrhoea proclive est, ipecacuanham fere semper praetulerim. Haec enim, praeter qualitatem suam quae ad corporis superficiem dirigat, exhalationemque per cutem inflaurat, vomitum excitando, in diarrhoea maximo usui esse potest. Atque etiam, quamvis diarrhoea a cibo male concocto primitus non orta fuerit, tamen, uti supra monstratum est, hic morbus tonum ventriculi debilitat, et pravam concoctionem plerumque inducit, adeoque materias crudas et acres ventriculus in intestina im-

mittit,

mittit, quae saepissime diarrhoeam maligniorem reddant. Huic tamen vomitione quodammodo obviam iri posset; quia haec non solum ventriculi cruditates sursum ejicit, sed etiam moderate adhibita, ventriculum ad concoctionem validiorem excitat.

Possibile est etiam bilis sursum excretionem, ejus quantitatem qui alioquin in intestina descenderet, ibique pro stimulo esset, minuendo, in diarrhoea usui esset posse; utrum etiam vomitus in diarrhoea non utilis esse posset, motum peristalticum, nimis jam in inferiorem partem proclivem, invertendo, determinare nollem; id autem verisimile videtur; nam quodammodo certum est, motum peristalticum, inter vomendum, per longum intestinorum spatium, pro tempore inversum esse. Ex quibus omnibus factis perspicuum erit, vomitum, ope emetici excitatum, remedium esse sanandae diarrhoeae bene accommodatum.

Modus alius ad corporis superficiem dirigendi, exhalationemque per cutem instaurandi, ex adhibitis diaphoreticis vel sudorificis esse potest, atque ad hanc rem medicamentum efficacissimum sine dubio est *pulvis Doveri*, opium scilicet cum ipecacuanha et sale neutro conjunctum. Quod quidem raro in diarrhoea adhibitum fuit,

sed

fed a medico experto accepi, adhibitum, fucceffus admodum felices habuiffe. Hoc tamen notandum, pulverem iftum non effe tanta dofi exhibendum, ut sudorem copiofum et diuturnum moveat. Nam quum hoc, fine incommodo, faepius repeti non poffet, ideoque exhalationem per cutem, per intervalla multum fe remittere fineret, magis ad rem erit, illud medicamentum parvis dofibus, quae faepius magis commode repeti poffent, administrare. Hoc autem mihi obfervandum fuggerit, morem, qui invaluit opium cum vini antimonialis vel tartari emetici portione commixtum exhibendi, fingulis noctibus tempore decubitus, faepe in diarrhoea felici fucceffu úfum fuiſſe. Talis quidem mos haud multum diſſimilis eſt, pulveris Doveri ufui quam modo propoſuimus. Nobis tamen perſuaſum eſt pulverem huncce adhibitum, utpote certiffime atque efficaciffime ad ſuperficiem corporis ducentem, ſemper a peritis anteponendum fore.

Nulla ratione virium ejus diaphoreticorum habita, opium diarrhoeae remedium eſt, et propterea frequentiffime adhibitum. Irritabilitatem fibrarum muſcularium inteſtinorum aufert, ideoque motum periftalticum minuit et pene ſuſpendit; unde cauſam proximam diarrhoeae directo

recto aggreditur, et quoniam simul vim diaphoreticam constanter exerit, semper tutum et saepe ex seipso, sufficiens ad hunc morbum sanandum, remedium est. Irritabilitatem adimendo, spasmodicas affectiones, tormina nimium, quae tam frequenter diarrhoeam comitantur, fere certo aufert. Opium igitur in hoc morbo remedium est non minus optabile quam utile: Nec aliquid obstat, quo minus eo libere utamur. In dysenteria, non item, quippe in hac tamen pars intestinorum semper constrictionem patitur quae usu opii augeri posset. Sed quia nulla adest in diarrhoea ejusmodi constrictione, nihil impedit, quo minus opium in hoc morbo adhibeatur.

Multi medicorum usum opii damnarunt, rati eum evacuationem impedire, indeque materiae acris quae evacuari deberet, retentionem inducere; non tamen est cur hoc in diarrhoea mucosa metueremus; quum enim opium viribus suis diaphoreticis haud parum confert ad proclivitatem versus intestina impediendam, ita irritabilitate excernentium adempta, fluidorum intestinalium, atque adeo pravi acris in cavitatem intestinorum excretionem certe minuit. Hoc modo majus emolumentum quam damnum allaturum

credendum est, et malum quod ex retentione acrii hâc occasione suspicandum esset, omnino incertum et forsan prorsus negligendum est. Verisimile enim est, ex folliculorum mucosorum excretionem suspensam, et liquoris in iisdem stagnatione, ut humor postea effusus mitior et multo minus irritans fieret.

Remedia porro astringentia, eaque valde varia, in diarrhoeâ saepe sunt adhibita; et quorum multa, propter vim suam in hoc morbo sanando efficacem, valde laudata sunt. Non quidem dubitandum, ea saepe utilia fuisse; sed unde hoc fiat non semper, meo iudicio, recte explicatur. Diarrhoeam plerumque a laxitate fibrarum muscularium in tubo intestinorum oriri a vulgo medicorum putatum fuit; et nos ipsi fatemur, laxitatem quandam seu debilitatem fibrarum muscularium statum irritabilem afferre posse; unde actio motus peristaltici fortassis augetur, et diarrhoea ex causis levioribus excitaretur; ideoque astringentia, laxitatem et inde irritabilitatem amovendo, interdum usui esse possunt. At tamen valde dubito, an res huiusmodi unquam eveniat.

Mihi curae fuit supra ostendere, faeces, seu quae tubo intestinorum continentur, propria sua

F

gravitate

gravitate sola non descendere, debilitatemque motus peristaltici plerumque alvum tardam, seu statum diarrhoeae contrarium, inducere; atque me vix continere possum quin affirmem, diarrhoeam rarissime illis supervenire, qui debilitatis in tubo intestinorum signa prius ostendissent. Simul, quoniam diarrhoeam ab accelerata deorsum actione motus peristaltici semper pendere diximus, hoc a stimulo muscularibus intestinorum fibris admoto oriri semper videtur; et ex stimulo admoto in omnibus similiter existit diarrhoea, intestinis nullo modo, quantum a nobis percipi possit, necessario ad huic rei favendum praedispositis. E. g. in purgantibus administrandis, status irritabilis in quibusdam hominibus tantus fit, ut parva ejusmodi medicamenti portio, copiosam alvi dejectionem efficiat: Dato autem irritabilitatis statu, novimus, quo majores sint aegroti vires, eo majorem, quod ad quantitatem atque stimulandi vim, medicamenti portionem esse debere.

Ex quibus omnibus mihi colligere videor, astringentia non, uti vulgo putant, in laxitate aut debilitate fibrarum muscularium intestinorum corrigenda operari, et hoc alio modo explicari oportere. Possibile quidem est, astringentia con-

trahenda et inde augenda densitate et fibrarum muscularium robore, earum statum irritabilem aliquantum diminuere, et hoc modo contra diarrhoeam usui esse posse; sed effectum eorum, ad hanc rem multum conferre meipsum ut credam inducere nequeo. Ea igitur operari opinor ora constringendo excernentium quae fluida in intestina infundunt, et a quibus praesertim effunditur, stimulus qui diarrhoeam excitat: Dumque hoc modo obviam itur fluidi mucosi perpetuae effusioni, idem ut stagner, atque mitius fiat, uti supra dictum est, efficiunt.

Hoc modo, uti ego opinor, astringentia diarrhoeae remedio sunt. Utrum tamen haec mendedi methodus semper tuta sit, atque idonea, determinare nequeo. Si sanguinis fluxus ad intestina plenus sit, oppositione facta ne ibi humores effundantur, periculum inde oriri potest, vel propter vasa intestinalia infarcta, vel propter fluidorum directionem in alias partes ex quibus facile effundi non possunt. His mecum reputatis, opinari vellem, astringentia in recente diarrhoea adhiberi non debere, nisi in mitissima morbi specie, vel saltem donec remediis supra memoratis, fluidorum cursus ad corporis superficiem dirigatur, et exhalationis per cutem obstructio removeatur. Itaque si

laxitas

laxitas in intestina excernentium, per diuturnam effusionem magnopere aucta fuerit, morbique continuatio a laxitate huiusmodi, potius quam ab aliqua aucta proclivitate in fecernentia, ortum fuerit, astringentibus tum praecipue utendum est.

Apud scriptores de materia medica, ejusmodi remediorum multa et varia recensentur, et viribus admodum diversis certe praedita sunt. Sed eorum selectionem satis peritam exhibere equidem nequeo; et notatum solummodo velim, medicamentum nobis nuper innotuisse, cui nomen *gummi kino*, quod potentissimum videtur, et, quia in *menstruo* vel aquoso vel *spirituoso* solutu facile fit, ad exhibitionem omnino commodissimum esse potest.

Curationem autem diarrhoeae hic missam facere non possum, priusquam in hac monitum perutile dederim. Hoc est, quod ex diarrhoea convalescentes quam cito sub dio esse, atque exercitationem ferre valeant, quotidie vel equo vel rheda vehi oportere. Quantum huiusmodi exercitatio ad promovendam per cutem exhalationem, et ad affluxum versus intestina avertendum, conferre possit, bene norunt medici,



dici, nullaque alia re magis manifestum est, quam a navigatione, sub qua alvus plerumque maxime constipata fit. Simul tamen monendum est, gestationem in primis tentaminibus necessario leniorem breviorisque esse debere; sed nisi sensim longior fieri possit, et quotidie fere adhibeatur, ad vires aegri refoveandas multum conferre non valebit.

F I N I S.

si

C O R R I G E N D A

Pag. 6.	lin. 8.	a fine, pro	morbis	lege	morbus.
	8.	2.	subito		subitae.
	12.	15. 16.	cum quae		cumque.
	13.	16.	adhibiti		adhibitae.
	16.	ult.	Boerhavaii		Boerbaavii.
	21.	7. a fin.	possint		possit.
	et	5. a fin.	ullo		ulla.
	23.	11:	comprehendendi		comprehenden-
					da.
	24.	8. a fin.	diuturnam		diuturnum.
	27.	1. 2.	quae ue		quaeque.
	35.	5.	evineant		evadunt.
	38.	9.	post minuendo		insere vomitum.
	39.	6. a fin.	pro diaphoreticorum,		lege diapho-
			reticarum.		
	40.	10.	dele tamen.		
	45.	lin. penult.	pro refoveandas,		lege refoveendas.



